

CARDIO-VASCULAIRE – HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Hanon O et al. French Society of Geriatrics and Gerontology; French Society of Cardiology. Expert consensus of the French Society of Geriatrics and Gerontology and the French Society of Cardiology on the management of atrial fibrillation in elderly people. Arch Cardiovasc Dis 2013;106:303-23.

La fibrillation atriale concerne environ 1 million de personnes en France dont par les deux tiers ont plus de 75 ans. Le consensus d'experts réunit à la fois par la Société Française de Gériatrie et Gérontologie et la Société Française de Cardiologie insiste sur la nécessité de réaliser une évaluation gériatrique standardisée pour construire un projet thérapeutique à la fois médicamenteux, fonctionnel et social. Les risques ischémique et hémorragique doivent être évalués et comparés. Le bénéfice comparé des anticoagulants oraux directs par rapport au AVK est de nouveau montré, en proposant des prises en charge en fonction des profils de comorbidité.

Agarwal KS, Kazim R, Xu J, Borson S, Taffet GE. Unrecognized Cognitive Impairment and Its Effect on Heart Failure Readmissions of Elderly Adults. J Am Geriatr Soc. 2016;64:2296-301.

Une altération cognitive (mini cog) est un facteur de réadmission à trente jours lorsqu'elle est associée à une insuffisance cardiaque. Seulement 9 % des patients ont eu une évaluation cognitive.